

item code/cikkszám:  
10825



HU

## Bradoplus higiénés kéz- és bőrfertőtlenítő, műtéti bemosakodó 100ml pumpás, 250ml pumpás, 500ml és 1L

**Alkalmazási terület:** Bőrfertőtlenítésre, higiénés kézfertőtlenítésre, és műtéti kézfertőtlenítésre (sebészi bemosakodásra) alkalmazható.

**Hatátspektrum:** baktericid (MRSA), tuberkulocid, fungicid, virucid (HBV, HIV ).

**Formuláció:** Felhasználásra kész folyadék.

**Alkalmazási koncentrációk, behatási idők:** A készítményt töményen, hígítatlanul kell alkalmazni. Higiénés kézfertőtlenítés: az adagolóból 5 ml fertőtlenítőszerrel juttatunk a tenyérbe, melyet a kézen alaposan eldörzsölünk. Behatási idő: 30 másodperc. Tuberkulocid hatás eléréséhez 1 percnél hosszabb behatási idő szükséges.

**Sebészi bemosakodás:** az adagolóból 5 ml fertőtlenítőszerrel juttatunk a tenyérbe, melyet a kézen és az alkaron alaposan eldörzsölünk 1 percig, a műveletet még négyszer megismételjük. A sebészi bemosakodáshoz szükséges fertőtlenítőszer mennyisége: 5x5 ml=25 ml. A sebészi bemosakodás ideje: 5x1 perc=5 perc. Abban az esetben, ha a bemosakodást megelőző tisztasági kézmosás után kéztörölés történik, akkor száraz kézre kb. 5 ml kéz fertőtlenítőszerrel adagolunk, melyet a kézen és az alkaron 1,5 percig alaposan eldörzsölünk, majd a műveletet megismételjük. Bemosakodási idő: 2x1,5 perc=3 perc. Bőrfertőtlenítés: • injekciók, vérvétel, punkciók előtt a behatási idő 20-30 másodperc. • műtéti bőrfelület fertőtlenítése: a fertőtlenítendő bőrfelületet a készítménnyel alaposan átítatott géz vagy tupfer segítségével áttöröljük úgy, hogy kezeletlen részek (ún. ablakok) ne maradjanak. A készítményt a fertőtlenített bőrfelületre hagyjuk megszáradni.

**Behatási idő:** 1 perc. A műveletet még egyszer megismételjük. Foggyűrűgyekben gazdag bőrfelületen a fertőtlenítés ideje 10 perc. A készítményt a műtétet követő varratkezeléshez is alkalmazható.

GB

## Bradoplus hand and skin disinfectant 1L/500ml/250ml/100ml

**Field of application:** For disinfection of the skin, the hand and for surgical scrub.

**Formulation:** application ready liquid.

**Concentrations of application and impact time:** The product is to be applied concentrated, undiluted. Hygienic hand disinfection: Press 5ml from the dispenser in the hand and scrub it accurately. Impact time: 30sec. For the tuberculocid effect, more than 1 minute of impact time is needed. Surgical scrub: Press 5ml from the dispenser in the hand and scrub it accurately on the hand and arm during 1 minute, then repeat it four times. For surgical scrub the needed quantity is 5x5ml =25ml. The needed time is 5x1min=5min. If the hands are wiped after the hygienic hand wash before the surgical scrub, press approx. 5ml of disinfectant on dry hand and scrub it accurately on the hands and arms during 1.5 minutes and repeat it. Scrubbing time: 2x1,5 min=3 min. Skin disinfection: impact time before injection, puncture, blood test: 20 to 30 sec. impact time before surgical intervention: Disinfection of surface for surgical intervention: Wipe the surface with a sodden gauze or swab without leaving a non-treated part (so called window). Let the product dry on the surface.

**Impact time:** 1 min. Repeat the process once more.

**Impact time on skin surfaces rich in sebaceous glands:** 10 min. The product is appropriate for the treatment of suture.

1L

250 ml pump

piece-darab/#	10	piece-darab/#	10
piece-darab/pallet-raklap	600	piece-darab/pallet-raklap	1550
#/pallet-raklap	60	#/pallet-raklap	155

500ml

100ml pump

piece-darab/#	10	piece-darab/#	10
piece-darab/pallet-raklap	1020	piece-darab/pallet-raklap	3990
#/pallet-raklap	102	#/pallet-raklap	399



item code/cikkszám:  
10826

item code/cikkszám:  
11589

item code/cikkszám:  
14296